



3^ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
“Η ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ”
23-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ



Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ευγενία Εμμανουηλίδου

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας
Ρευματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ



Περίπτωση 1

Ατομικό Αναμνηστικό

- Γυναίκα 51 ετών
- Αρτηριακή Υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία, Υποθυρεοειδισμό

Παρούσα Νόσος

- Από 6 μήνου άλγος μέσου ποδός και 2^ο+3^ο ΜΤΦ (ΔΕ)

Κλινική εξέταση

- Αρθρίτιδα μέσου ποδός και 2^ο + 3^ο ΜΤΦ (ΔΕ)

Εργαστηριακός Έλεγχος

- ΤΚΕ (-), CRP (-), RF (-), anti-CCP (-), ANA (-)

Περίπτωση 1


- Κατά την ρευματολογική εκτίμηση, η ασθενής προσκομίζει φυσιολογική Ro ΔΕ άκρου ποδός, ενώ έχει προηγηθεί ορθοπεδική εκτίμηση και MRI ΔΕ άκρου ποδός

MRI ΔΕ άκρου ποδός



STIR COR

MRI ΔΕ άκρου ποδός



T1 SAG

Διάγνωση

Διαβρωτική οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα
με προσβολή μέσου ποδός και ΜΤΦ (ΔΕ)

- 1^η εκδήλωση της νόσου η προσβολή του μέσου ποδός και των ΜΤΦ σε 14% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Foot problems in a group of patients with rheumatoid arthritis: an unmet need for foot care. Sahin M. et al. Open Rheumatol J. 2012; 6: 290–295.

Περίπτωση 2

Ατομικό Αναμνηστικό

- Γυναίκα 37 ετών, Καπνίστρια

Παρούσα Νόσος

- 4 μήνες μετά από τοκετό χαμηλή οσφυαλγία με μεικτούς χαρακτήρες (μηχανικούς-φλεγμονώδεις)

Κλινική εξέταση

- Χωρίς ευαισθησία κατά την πλήξη ιερολαγόνιων άμφω, χωρίς περιφερική αρθρίτιδα
- Schober test --> 6cm


Εργαστηριακός Έλεγχος

- HLA-B27 (-), TKE (-), CRP (-)
- Ro ΟΜΣΣ F+P και λεκάνης-ισχίων (-)

Διαφορική Διάγνωση


- Εκφυλιστική vs Φλεγμονώδης Σπονδυλοαρθρίτιδα

MRI ιερολαγονίων



STIR TRA

MRI ιερολαγονίων



STIR COR

Διάγνωση

Ιερολαγονίτιδα μετά από τοκετό

- Το οστικό οίδημα στη MRI ιερολαγονίων είναι μη ειδικό εύρημα για ιερολαγονίτιδα και μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις αυξημένου μηχανικού στρες
- 60% των γυναικών μετά τον τοκετό πληρούσαν τα ASAS κριτήρια για θετική MRI και μετά από 6 μήνες μόνο 15%
- Συνίσταται μια περίοδος αναμονής τουλάχιστον 6 μηνών για τη διενέργεια MRI ιερολαγονίων σε γυναίκα μετά τον τοκετό με χαμηλή οσφυαλγία και αν θετική, επανάληψη σε 12 μήνες

High prevalence of spondyloarthritis-like MRI lesions in postpartum women: a prospective analysis in relation to maternal, child and birth characteristics. Renson T, et al. Ann Rheum Dis 2020;79:929–934.

Περίπτωση 3

Ατομικό Αναμνηστικό

- Αγόρι 13 ετών, ελεύθερο α/α

Παρούσα Νόσος

- Από 3μήνου άλγος ΔΕ κνήμης

Κλινική εξέταση

- Αρθρίτιδα ΠΔΚ και μέσου πόδα (ΔΕ)


Εργαστηριακός έλεγχος

- RF (-), anti-CCP (-), TKE (-), CRP (-)

Διαφορική Διάγνωση

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα vs Τραυματικής αιτιολογίας άλγος

MRI ΔΕ ποδοκνημικής



STIR SAG

MRI ΔΕ ποδοκνημικής



STIR COR

Διάγνωση

Chronic recurrent multifocal osteomyelitis
(CRMO)- Χρόνια υποτροπιάζουσα
πολυεστιακή οστεομυελίτιδα

- Σπάνια αυτοφλεγμονώδης νόσος των οστών στα παιδιά
- Κύρια προσβολή η μετάφυση των μακρών οστών των κάτω άκρων
- Η προσβολή του μέσου ποδός και της ΠΔΚ περιγράφεται σπάνια στη βιβλιογραφία (case reports)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ